

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN INFARK MIOKARD AKUT DI RUANGAN ICU RSUD KOTA BOGOR

Yufi Aliyufiudin

Program Studi Diploma III Keperawatan
STIKes Wijaya Husada Bogor

Abstrak : Kecemasan merupakan penyebab utama konseling psikiatri di ICU. Pada pasien dengan infark miokard akut, kecemasan merupakan salah satu keadaan yang dapat menimbulkan adanya perubahan keadaan fisik, maupun psikologis. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan yaitu usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan pengalaman. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien dengan Infark Miokard Akut di Ruang ICU RSUD Kota Bogor. Desain Penelitian menggunakan *Cross sectional* dan data yang dikumpulkan dari responden menggunakan lembar kuesioner dan lembar observasi. Sampel berjumlah 30 responden yang didapat menggunakan teknik *total sampling*. Hasil Penelitian dengan menggunakan uji *Chi-Square* dengan hasil nilai $\alpha < 0,05$. Kesimpulan dalam penelitian ini terdapat hubungan antara faktor usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan pengalaman dengan tingkat kecemasan. Saran sebagai bahan referensi, dalam mengembangkan penelitian selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pada pasien infark miokard akut semisal nya lama hari rawat, dukungan keluarga, diagnosa medis dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Kecemasan, Infark Miokard Akut

Abstract : Anxiety is the main cause psychiatric counseling in ICU. In patient with acute myocardial infarction, anxiety is one of the circumstances that could give rise to the physical changes, as wall as psychological. There are several factors associated with the level of anxiety that age, education level, sosio economic status, and experience. The purpose of this research to determinan, factor's assosiated with the level of anxiety in patient acute myocardial infarction in ICU room of RSUD Bogor City. Research's design has used cross sectional design and the data are collected from respondens by kuesioner and observation sheet. The Samples in this research was taken with total sampling technique with 30 respondents as sample. The result of the research using atest of $\alpha < 0,05$. The conclusion of this research is a relationship between age, education level, socio economic status level of experience with anxiety. Suggestion as reference material for the development of future research with regard to the factors associated with the level of anxiety in patien with acute myocardial infarction. For example, long day care, family support, medical diagnostic, and another etc.

Keywords : Anxiety, acute myocardial infarction.